

# Corredores endémicos semanales. El Bolsón.

**Actualización a la SE 22 - 2023.**


Servicio de Epidemiología  
Hospital de Área El Bolsón.

# Corredores SE 22

(actualización 5/6/23)

- Corredor de Bronquiolitis
- Corredor de Enfermedad Tipo Influenza (ETI)
- Corredor de Neumonía
- Corredor de Diarreas


Corredor endémico semanal de Bronquiolitis en < de 2 años, El Bolsón. 2023 hasta SE 22 Históricos 5 años: 2016 a 2022.



Hasta la SE 22, se registraron 30 casos de Bronquiolitis en < de 2 años con una tasa acumulada de 1.2 casos por mil hab.

De acuerdo a las notificaciones al módulo C2 y según las estimaciones realizadas, para la SE 22 del 2023, la curva transita la zona de alerta, respecto a lo ocurrido durante el último quinquenio para el mismo período sin considerar el año 2020 y 2021.


Corredor endémico semanal de ETI, El Bolsón. 2023 hasta SE 22 Históricos 5 años: 2016 a 2022.



Hasta la SE 21 se registraron 700 casos de ETI con una tasa acumulada de 28.4 casos por mil hab.

De acuerdo a las notificaciones al módulo C2 y según las estimaciones realizadas, para la SE 21 del 2023, la curva de ETI transita en aumento la zona de brote, respecto a lo ocurrido durante el último quinquenio para el mismo período sin considerar el año 2020 y 2021.


Corredor endémico semanal de Neumonías, El Bolsón. 2023 hasta SE 22 Históricos 5 años: 2016 a 2022.



Hasta la SE 22, se registraron 90 casos de Neumonías con una tasa acumulada de 3.6 casos por mil hab.

De acuerdo a las notificaciones al módulo C2 y según las estimaciones realizadas, a la SE 22 del 2023 la curva de Neumonías transita la zona de éxito, respecto a lo ocurrido durante el último quinquenio para el mismo período sin considerar el año 2020 y 2021.

Corredor endémico semanal de Diarreas, El Bolsón. 2023 hasta SE 22 Históricos 5 años: 2016 a 2022.



Hasta la SE 22 se registraron 994 casos de Diarreas Agudas con una tasa acumulada de 40.4 casos por mil hab.

De acuerdo a las notificaciones al módulo C2 y según las estimaciones realizadas, durante las primeras semanas epidemiológicas la curva de diarreas se mantuvo en ascenso, con un pico en la SE 7 llegando a la zona de brote. A la SE 22, la curva se encuentra transitando la zona de alerta, respecto a lo ocurrido durante el último quinquenio para el mismo período sin considerar el año 2020 y 2021.

 [epidemiologiadapahaeb@gmail.com](mailto:epidemiologiadapahaeb@gmail.com)